


Amoniti

Amoniti su izumrli četveroškržni glavonošci, koji su najčešće bili planispiralno savijeni.

Grada



Različiti oblici kućica amonita.

Kućica im je podijeljena na nastanjenu komoricu, koja je znatno dulja nego kod nautilida, i *phragmocon* (zračne komorice). U zračnim komoricama nalaze se plinovi. Njihovom regulacijom borave na određenoj dubini, dok se kreću izbacivanjem mlaza vode kroz lijevak. Zračne komorice su pregrađene *septima* i kroz njih prolazi *sifo* koji je naječešće uz vanjski rub zavoja. Za razliku od nautilida koji imaju udubljene *septe* u odnosu na ušće, amoniti imaju izbočena. Kućice amonita su troslojne, *aragonitne*. Također imaju i poklopce (*aptychus*) koji su rožnati ili kalcitni. Vapnenci građeni od tih poklopaca zovu se *aptiški vapnenci*. Razlikujemo i *evolutne* i *involutne* kućice. *Involutne* kućice ponekad imaju pupak (*umbilicus*). *Septi* su iznutra prirasli za stijenku kućice šavovima, vidljivih na vanjskoj strani kućice, koje zovemo *lobna linija* ili *sutura*. Njihovim boranjem možemo pratiti evoluciju amonita. Od *gonijatine* (najslabije borane), preko *ceratitne* pa do *amonitne*.

Amoniti



Umjetnički prikaz amonita iz roda *Asteroceras*

Raspon fosila Silur - Kreda

Sistematika

Carstvo: Animalia
Koljeno: Mekušci
Razred: Cephalopoda
Podrazred: **Ammonoidea**
Zittel, 1884

redovi i podredovi

Red Ammonitida

- Ammonitina
- Acanthoceratina
- Ancyloceratina
- Phylloceratina
- Lytoceratina

Red Goniatitida

- Goniatitina
- Anarcestina
- Clymeniina

Red Ceratitida

- Ceratitina
- Prolecanitina

amoniti (prema lat. Ammonis cornu: Amonov rog), (Ammonoidea), red izumrlih glavonožaca. Građom tijela nalik su Nautilusu; obično imaju simetrično spiralno savijene kućice, promjera 0,5 cm do 2,5 m. Kućica je pregrađena klijetkama ispunjenima plinom kako bi životinja, koja je živjela samo u zadnjoj klijetki, lakše plivala. Pregradci (septi) prirasli su o stijenku različito boranim šavovima (tzv. sutura), po kojima se razlikuju pojedine vrste. Živjeli su od devona do kraja krede, brzo se razvijali i raširili, pa su vrlo dobri provodni fosili. Dosad je poznato najmanje 2000 rodova s više od 6000 fosilnih vrsta.

Dobavljeno iz "<https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Amoniti&oldid=5186805>"

Ova stranica posljednji je put uređivana 3. siječnja 2019. u 11:27.

Tekst je dostupan pod licencijom [Creative Commons Imenovanje/Dijeli pod istim uvjetima](#); dodatni uvjeti se mogu primjenjivati. Pogledajte [Uvjete uporabe](#) za detalje.